



# MY WAY TO GROW



## SUBSTRATES



Cocomix Plus



Coco Brick

Fertilization plan  
Coco cultivation

Bemestingsschema  
Kokos

Plan de fertilización  
para cultivo en Coco

## MAIN FERTILIZERS

## STIMULATORS

			EC**							
Growth period Groeiperiode Período de crecimiento	9	9	0,9	ML / 10 LTR	8	5	6	5	-	2
Start flowering phase Start bloeiperiode Comienzo (o principio) de floración	13	13	1,2		7	5	6	5	-	2
	16	16	1,4		5	8	6	5	-	2
	18	18	1,6		-	8	6	5	-	2
Mid flowering phase Midden bloeiperiode Mitad floración	18	18	1,6		-	10	6	5	-	2
	18	18	1,6		-	10	6	5	4	2
	18	18	1,6		-	10	6	5	7	2
Last flowering phase Laatste bloeiperiode Fin de la floración	16	16	1,4		-	10	6	5	8	2
	<13	<13	1,2		-	10	6	5	10	2
Rinse last week Laatste week spoelen Enjuagar la última semana	-	-	-		-	-	-	5	7	-



**BIONOVA**  
PREMIUM FERTILIZERS

### Tips Coco

- When using Coco Forte A+B: first mix A in the vessel, then mix in B.
  - When using Silution, first add water to the feed vessel, then silution and stir well. Wait 30 minutes, then mix in the main fertilizers and stimulators.
  - Adjust the pH to ± 5.5 – 6.5.
  - For the best results we recommend to use our Cocomix Plus or Coco Bricks.
  - In areas of soft water or when using RO-water, it is recommended to add Ca 15 (± 4 ml./10 liters) and MgO 10 (± 4 ml./10 liters) to the fertilizer mix.
  - The dosage of fertilizers can be adjusted in steps of 10% more or less.
  - For long flowering plants and when using Longflower-Supermix, the schedule should be extended from mid flowering.
- \*\* EC value is measured with Reverse Osmosis water with EC 0.0.



Longflower  
Supermix



Autoflower  
Supermix

### Tips Kokos

- Bij gebruik Coco Forte A+B: eerst A mengen, daarna B erbij mengen.
  - Wanneer Silution gebruikt wordt, eerst water aan de tank toevoegen, daarna Silution toevoegen en goed roeren. Wacht 30 minuten, daarna de hoofdmeststoffen en stimulatoren mixen.
  - pH stellen naar ± 5.5 – 6.5.
  - Voor optimaal resultaat raden wij aan onze Cocomix Plus of Coco Bricks te gebruiken.
  - In gebieden met zacht water of met gebruik van RO-water, is het aanbevolen Ca 15 (± 4 ml./10 liter) en MgO 10 (4 ml./10 liter) aan de meststoffenmix toe te voegen.
  - De dosering van de hoofdmeststof mag ± 10% aangepast worden.
  - Bij langbloeiende planten en het gebruik van Longflower-Supermix moet het schema verlengd worden vanaf midden bloeifase.
- \*\* EC waarden zijn gemeten in Osmose water met EC 0.0.

### Consejos Coco

- Cuando use Coco Forte A + B: primero mezcle A en el tanque, luego agregue y mezcle B.
  - Cuando use Silution, primero agregue agua al tanque de alimentación, luego Silution y revuelva bien. Espere 30 minutos y luego mezcle los fertilizantes principales y los estimuladores.
  - Ajuste el pH a ± 5.5 - 6.5.
  - Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar nuestro Cocomix Plus o Coco Bricks.
  - En áreas de agua blanda o cuando se usa agua RO, se recomienda agregar Ca 15 (± 4 ml./10 litros) y MgO 10 (± 4 ml./10 litros) a la mezcla de fertilizante.
  - La dosis de fertilizantes se puede ajustar en pasos de más o menos 10%.
  - Para plantas de floración larga y cuando se usa Longflower-Supermix, el programa debe ser extendido desde mediados de floración.
- \*\* El valor EC se mide con agua de ósmosis inversa con CE 0.0.